

СИБИРСКАЯ ЯЗВА



Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями *Bacillus anthracis*.

Источник инфекции – чаще сельскохозяйственные животные (козы, овцы, коровы, лошади, верблюды, ослы, олени), реже дикие животные.

Пути передачи

- контактным путем: при прямом контакте с больными животными, их трупам, продуктами и сырьем животного происхождения
- воздушно-пылевым путем: при вдыхании пыли со спорами бактерий
- алиментарным путем: при употреблении мяса больного животного

При кожной форме

- ✓ Безболезненные язвы с черным дном (сибиреязвенный карбункул)

При легочной форме

- ✓ Кашель с кровью
- ✓ Одышка

Общие симптомы

- ✓ Лихорадка
- ✓ Головная боль
- ✓ Озноб
- ✓ Слабость
- ✓ Боли в пояснице




При кишечной форме

- ✓ Боли в животе
- ✓ Тошнота
- ✓ Рвота
- ✓ Жидкий стул с кровью

Меры профилактики сибирской язвы

- 1 Не покупать мясные продукты с рук и в непроверенных местах
- 2 Не приобретать шкуры, одежду и сувениры, изготовленные из кожи и шерсти неизвестного происхождения
- 3 Выполнять необходимые санитарно-гигиенические мероприятия на предприятиях, перерабатывающих продукты и сырье животноводства



Вакцинация против сибирской язвы проводится лицам из групп риска

Сельскохозяйственные работники, работники скотобоен, мясокомбинатов, животноводческих ферм, кожевенных заводов и т.п.