

# ПОЛИОМИЕЛИТ

Опасное для жизни инфекционное заболевание, вызываемое энтеровирусами.



## Источник инфекции

больной полиомиелитом человек или носитель вируса

## Путь передачи

- ✓ Преимущественно фекально – оральный,
- ✓ Реже – воздушно-капельный.

Инкубационный период колеблется от 4 до 30 дней.




Полиомиелит может проявляться по-разному, от бессимптомного носительства до тяжелых паралитических проявлений.

## Симптомы:

- ✓ Среди первых симптомов полиомиелита лихорадка, слабость, головная боль, тошнота и рвота, боли в конечностях.
- ✓ В тяжелых случаях в процесс вовлекаются двигательные нервные клетки, и наступают параличи.

## Наиболее подвержены заболеванию дети:

- ✓ Не привитые против полиомиелита.
- ✓ Получившие менее 3-х прививок против полиомиелита.
- ✓ Привитые с нарушением сроков вакцинации.



## Осложнения

- ✓ Ателектазы легких, пневмония, сердечная недостаточность, желудочно-кишечные расстройства, парез кишечника и мочевого пузыря.
- ✓ Параличи имеют стойкий характер и сопровождаются атрофией мышц и ортопедическими осложнениями – остеопорозом, переломами, сколиозом, нестабильностью суставов.



**Больной может погибнуть от дыхательной недостаточности, вызванной параличом дыхательных мышц.**

