

Краснуха — острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, преимущественно с воздушно-капельным путем передачи

Пути передачи

Воздушно-капельный

- ✓ вирус передается во время кашля, чихания, разговора

Трансплацентарный от матери к плоду




Симптомы

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Конъюнктивит
- ✓ Кашель
- ✓ Насморк
- ✓ Увеличение лимфатических узлов
- ✓ Сыпь на разгибательных поверхностях рук и ног, вокруг суставов, на ягодицах и спине



Краснуха особенно опасна для беременных в связи с высоким риском внутриутробного инфицирования плода, влекущего за собой множественные грубые пороки развития



Надежная защита от краснухи — вакцинация.

Вакцинация проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

Противоэпидемические мероприятия в очаге краснухи

Изоляция больного

1

Заболевший должен быть отстранен от здоровых лиц на срок не менее 7 календарных дней с момента появления сыпи

2

Дезинфекция воздуха и помещений

Частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств

3

Наблюдение за контактными лицами

За непривитыми и не болевшими краснухой устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня

Соблюдение этих мер предотвратит дальнейшее распространение краснухи и поможет сохранить здоровье