ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

КЭП

Острая вирусная инфекция, которая передается людям комарами

Эндемичные страны

Преимущественно страны Африки и Южной Америки в зоне влажных тропических лесов

Источник инфекции — больной человек и обезьяны

В отсутствие переносчиков больной человек не представляет опасности для окружающих

Механизм передачи

Трансмиссивный

- Вирус передается при укусе комаров родов Aedes (в основном Ae. aegypti и Ae. albopictus) и Haemogogus

Надежная защита от желтой лихорадки — вакцинация!

Вакцинация проводится однократно взрослым и детям с 9-месячного возраста, выезжающим в эндемичные по желтой лихорадке страны, не менее чем за 10 дней до поездки

Симптомы

- Лихорадка до 40°С
- Сильная головная боль
- Тошнота и рвота
- Боль в спине и ногах
- Гиперемия лица и шеи
- Желтушность кожи и склер
- Геморрагическая сыпь
- Кровотечения



Меры профилактики для туристов, выезжающих в страны, эндемичные по желтой лихорадке:

1. Избегать укусов комаров
2. Носить закрытую одежду
3. Использовать репелленты
4. Использовать антимоскитные сетки для окон и дверей
5. Использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях