


Коклюш – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией *Bordetella Pertussis*.

Как передается:

- Воздушно-капельным путем

Бактерия выделяется с капельками слюны во время чихания и кашля



Симптомы:

- **Катаральный период:**
Общее недомогание, повышение температуры, насморк, чихание, легкий кашель.
- **Спастический период:**
Выраженный длительный приступообразный кашель, усиливающийся ночью.
- **Осложнения коклюша:**
Пневмония, отит, синусит, энцефалопатия, переломы ребер, кровоизлияния в мозг.



Вакцинация — эффективная мера профилактики коклюша.

Вакцинация проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Ее основная задача — защита детей в возрасте до 1 года, для которых это заболевание представляет наибольшую опасность.

Неспецифическая профилактика:

- при появлении признаков респираторной инфекции оставаться дома и обращаться за медицинской помощью
- соблюдать правила гигиены рук после посещения общественных мест, а также при уходе за больным
- соблюдать респираторный этикет: при чихании и кашле используйте салфетку

Противоэпидемические меры в очаге коклюша:

- 1 **Изоляция больного** — заболевший коклюшем должен быть отстранен от здоровых лиц.
- 2 **Дезинфекция воздуха и помещений** — частое проветривание и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, направленные на прерывание пути передачи инфекции.
- 3 **Наблюдение за контактными** — за лицами, находившимися в контакте с заболевшим, устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней (при появлении у контактных симптомов коклюша их необходимо изолировать).