

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ



группа инфекций, передающихся фекально-орально и характеризующихся разнообразными клиническими проявлениями от легкого респираторного заболевания до менингита

Основные пути передачи

- ✓ **Водный**
При употреблении некачественной воды или купании в водоемах и бассейнах
- ✓ **Контактно-бытовой**
Через грязные руки и инфицированные предметы
- ✓ **Пищевой**
При употреблении инфицированных продуктов

Симптомы

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Головная боль и боли в мышцах
- ✓ Першение и боль в горле
- ✓ Боли в животе, диарея, рвота
- ✓ Сыпь на коже и слизистых
- ✓ Ригидность мышц шеи



Меры профилактики:

- 1 Пить кипяченую или бутилированную воду
- 2 Не использовать для охлаждения напитков лед из воды неизвестного качества
- 3 Купаться на специально оборудованных пляжах и в бассейнах
- 4 Мыть руки после туалета, перед едой
- 5 Не трогать грязными руками лицо, нос, глаза
- 6 Мыть фрукты и овощи
- 7 Избегать контактов с людьми с симптомами инфекционных заболеваний (сыпь, температура, кашель и другие)

Противоэпидемические мероприятия в очаге энтеровирусной инфекции:

- 1 **Изоляция больного**
Заболевший должен быть отстранен от здоровых лиц
- 2 **Дезинфекция воздуха и помещений**
Частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств
- 3 **Осмотр контактных лиц**
Для выявления и отстранения из коллектива лиц с симптомами инфекции

Соблюдение этих мер предотвратит дальнейшее распространение инфекции и поможет сохранить здоровье