

## Неспецифическая профилактика:



Мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением и приемом пищи



Пить только кипяченую или бутилированную воду



Не использовать лед неизвестного происхождения для охлаждения напитков, так как он может быть изготовлен из некачественной воды



Тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением



В поездках уделять внимание безопасности воды и пищевых продуктов: избегать питания в подозрительных в эпидемиологическом отношении местах



Купаться в разрешенных для этих целей водоемах, не допуская попадания воды в рот



Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте



## РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Острая вирусная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи



Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

# РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Острая вирусная инфекция, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта



**Источник инфекции — больной человек или бессимптомный вирусоноситель**

Больной становится заразным за 48 часов до появления симптомов, а наибольшую опасность представляет в первые 3–5 дней заболевания.

## Пути передачи



### Контактно-бытовой

через загрязненные руки и предметы обихода



### Водный

Вирус передается во время кашля, чихания, разговора



### Пищевой

При употреблении загрязненных продуктов, чаще всего — молока и молочных продуктов

## Симптомы:

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Диарея
- ✓ Рвота
- ✓ Катаральные явления — кашель, насморк, гиперемия зева




**Ротавирусная инфекция опасна высоким риском развития обезвоживания, особенно у детей**

## Симптомы обезвоживания:

- ✓ Вялость
- ✓ Снижение частоты и объема мочеиспускания
- ✓ Сухость кожи и слизистых
- ✓ Жажда

При своевременном обращении за медицинской помощью прогноз заболевания благоприятный

У взрослых ротавирусная инфекция протекает легко, клинические симптомы часто отсутствуют



## Специфическая профилактика — вакцинация

В Российской Федерации вакцинация детей против ротавирусной инфекции включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также в региональные календари профилактических прививок в некоторых регионах.

**Вакцины против ротавирусной инфекции, зарегистрированные в России, предназначены для иммунизации здоровых детей в возрасте от 6 недель до 32 недель**

## Если в семье кто-то заболел?:

- ✓ Заболевшего изолировать
- ✓ Выделить больному личную посуду и полотенце
- ✓ После контакта с больным тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком
- ✓ Регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение

