

ИКСОДОВЫЙ КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ



Бактериальная инфекция, передающаяся человеку при присасывании клещей и часто принимающая хроническое рецидивирующее течение

Основной механизм передачи

Трансмиссивный

- ✓ Возбудитель передается при присасывании клещей рода *Ixodes*

При неблагоприятном течении клещевого боррелиоза происходит поражение кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем

Симптомы

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Слабость
- ✓ Головная боль
- ✓ Боль в мышцах и суставах
- ✓ Мигрирующая эритема



Лучшая профилактика – защита от клещей.

При посещении мест обитания клещей, рекомендуется:

- 1 Надеть однотонную светлую одежду и закрытую обувь, головной убор или капюшон. Все элементы одежды (рукава, брюки и носки) должны плотно прилегать к телу и полностью его закрывать
- 2 Брюки заправить в носки, верхнюю часть одежды заправить в брюки, волосы заправить под головной убор
- 3 Использовать специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией
- 4 Ходить по тропам и избегать высокой травы и кустарников
- 5 Не сидеть на траве, использовать брезент или туристический коврик
- 6 Проводить само- и взаимоосмотры каждые 15–20 минут
- 7 После возвращения домой снять одежду и полностью осмотреть тело, уделяя особое внимание пупку, паховым и подмышечным складкам, волосистой части головы и коже за ушами

При присасывании клеща:

- 1 Как можно быстрее удалить клеша и обработать место укуса антисептиком
- 2 Поместить извлеченного клеша в емкость и доставить в лабораторию для исследования на наличие инфекций
- 3 При положительном результате обратиться в медицинскую организацию для получения рекомендаций
- 4 Если клеша не удалось сдать на анализ, наблюдать за самочувствием в течение 30 дней
- 5 В случае появления температуры, головной боли, эритемы в области присасывания клеша незамедлительно обратиться в медицинскую организацию