

Бруцеллез

Инфекционное заболевание, характеризующееся разнообразными механизмами передачи и протекающее с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и половой систем

Источник инфекции



Больные бруцеллезом животные: овцы, козы, коровы, свиньи

Пути передачи

1



Пищевой

при употреблении мяса, молока и молочных продуктов, не прошедших термическую обработку



2

Контактный

при уходе за больными животными, обработке сырья животного происхождения

3



Воздушно-капельный

при вдыхании пыли, содержащей контаминированные фрагменты шерсти, навоза, земли



Инкубационный период

в среднем 1-4 недели, может затягиваться до 2-х месяцев



Симптомы



Повышение температуры тела



Потливость или озноб



Боль в мышцах и суставах



Увеличение лимфатических узлов

Меры профилактики

- 1 Не приобретать мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты на несанкционированных рынках и с рук
- 2 Мясо употреблять только после тщательной термической обработки
- 3 Употреблять только пастеризованное молоко и молочные продукты

Лицам, содержащим сельскохозяйственных животных, необходимо:

- 1 Своевременно проводить вакцинацию животных
- 2 Не допускать покупку, продажу, сдачу на убой животных и реализацию животноводческой продукции без уведомления ветеринарной службы
- 3 Использовать средства индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки, специальную одежду) при уходе за животными и при работе с продуктами и сырьем животного происхождения



Вакцинация людей против бруцеллеза проводится по эпидемическим показаниям лицам из групп профессионального риска

