

ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ ТИПА В (НІВ-ИНФЕКЦИЯ)



острая инфекция с воздушно-капельным путем передачи, характеризующаяся преимущественным поражением респираторного тракта и оболочек мозга

Основной путь передачи


Воздушно-капельный

- ✓ передается во время кашля, чихания, разговора

Надежная защита от гемофильной инфекции типа b — вакцинация.

Вакцинация проводится детям в соответствии с национальным календарем профилактических прививок по схеме:

- ✓ V1 — в 3 месяца
- ✓ V2 — в 4,5 месяца
- ✓ V3 — в 6 месяцев
- ✓ RV — в 18 месяцев



Симптомы

✓ При легком течении

ринит, боль в горле, конъюнктивит и др.

✓ Менингит

лихорадка, головная боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц, тошнота, рвота, спутанность сознания

✓ Пневмония

лихорадка, озноб, головная боль, слабость, обильное потоотделение, кашель, затрудненное дыхание, боль в груди

✓ Сепсис

высокая температура тела, геморрагическая сыпь

✓ Эпиглоттит (воспаление надгортанника)

озноб, высокая температура тела, слюнотечение, одышка, тахикардия, цианоз



Противоэпидемические мероприятия в очаге Ніб-инфекции

1 Изоляция больного

Заболевший Ніб-инфекцией должен быть отстранен от здоровых лиц

2 Дезинфекция воздуха и помещений

Частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств

3 Осмотр контактных лиц

Для выявления и отстранения из коллектива лиц с острыми респираторными заболеваниями, отитами, назофарингитами, гайморитами

Соблюдение этих мер предотвратит дальнейшее распространение гемофильной инфекции типа b и поможет сохранить здоровье