

Противоэпидемические мероприятия в очаге пневмококковой инфекции:



Изоляция больного

Заболевший пневмококковой инфекцией должен быть отстранен от здоровых лиц




Дезинфекция воздуха и помещений

Частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств



Осмотр контактных лиц

Для выявления и отстранения из коллектива лиц с локальными гнойно-септическими инфекциями (бронхит, отит, синусит и другие)




Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте



ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Группа инфекционных заболеваний, вызываемых *Streptococcus pneumoniae*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ

Группа инфекционных заболеваний, вызываемых *Streptococcus pneumoniae*, характеризующаяся многообразием клинических форм



Источник инфекции — больные любой формой инфекции, а также бактерионосители



Среди носителей пневмококка доминируют дети младшего возраста, посещающие организованные коллективы, а также взрослые, проживающие с детьми



Основной путь передачи

Воздушно-капельный

возбудитель передается при тесном общении, кашле, чихании, разговоре

Симптомы

Симптомы пневмококковой инфекции зависят от клинической формы болезни

✓ Пневмония

лихорадка, озноб, слабость, обильное потоотделение, кашель, одышка, затрудненное дыхание, боль в груди



Пневмококковая пневмония протекает тяжело, часто с осложнениями и нередко заканчивается летальным исходом, особенно у лиц старше 65

✓ Отит


высокая температура тела, стреляющая боль в ухе

✓ Менингит

высокая температура тела, резкая головная боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц, тошнота, рвота, спутанность сознания

✓ Бактериемия

высокая температура тела, геморрагическая сыпь



Надежная защита от пневмококковой инфекции — вакцинация!

Вакцинация проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Вакцинация детей:

- ✓ V1 — в 2 месяца
- ✓ V2 — в 4,5 месяца
- ✓ RV — в 15 месяцев

Вакцинация по эпидемическим показаниям показана:

- ✓ детям в возрасте от 2 до 5 лет
- ✓ лицам, подлежащим призыву на военную службу
- ✓ лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких
- ✓ лицам старше трудоспособного возраста, проживающим в организациях социального обслуживания

