

Неспецифическая профилактика



Мыть руки или использовать антисептик после посещения туалета, перед приготовлением и приемом пищи



Пить только кипяченую или бутилированную воду, не пить воду из источников, не предназначенных для питьевых целей



Соблюдать чистоту на кухне и рекомендации по условиям и срокам хранения продуктов в холодильнике



Тщательно мыть и обдавать кипятком ягоды, фрукты и овощи перед употреблением



Сырую пищу подвергать тщательной термической обработке



Не употреблять пищу с истекшим сроком годности



Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и «с рук», особенно сметану, молоко, творог



Не допускать проникновения насекомых в дом — мух и тараканов



Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте



БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ (ШИГЕЛЛЕЗ)

Это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода *Shigella*



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ (ШИГЕЛЛЕЗ)

Это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода *Shigella*, характеризующееся фекально-оральным механизмом передачи и поражением желудочно-кишечного тракта



Источник инфекции — больной человек или бактерионоситель

Больной становится заразным при появлении первых симптомов болезни

Пути передачи



Контактно-бытовой

через загрязненные руки и инфицированные предметы обихода



Водный

при употреблении инфицированной воды и купании в неположенных местах



Пищевой

при употреблении инфицированных продуктов, чаще всего — молока и молочных продуктов



В распространении дизентерии большую роль играют мухи и тараканы, которые могут переносить на своих лапках возбудителя заболевания



Симптомы:

- ✓ **Повышение температуры тела**
- ✓ **Головная боль и слабость**
- ✓ **Схваткообразные боли в животе**
- ✓ **Частый жидкий стул с примесью слизи и крови**
- ✓ **Тенезмы (ложные болезненные позывы к дефекации)**

Противоэпидемические мероприятия в очаге бактериальной дизентерии:



Изоляция больного

Заболевший должен быть отстранен от здоровых лиц




Осмотр и обследование контактных

Для выявления и отстранения из коллектива бактерионосителей и лиц с симптомами инфекции



Дезинфекция воздуха и помещений

Влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств



Специфическая профилактика

В соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинация против дизентерии, вызываемой *S. sonnei*, проводится:

- ✓ **Работникам медицинских организаций инфекционного профиля**
- ✓ **Лицам, занятым в сфере общественного питания и коммунального благоустройства**
- ✓ **Детям, посещающим дошкольные образовательные организации и отъезжающим в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям)**

