

Оспа обезьян

Высококонтагиозная
особо опасная вирусная инфекция,
распространенная в странах
Центральной и Западной Африки




Эндемичные территории:

Бенин, Камерун, Центральноафриканская Республика,
Демократическая Республика Конго, Габон, Гана,
Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Республика Конго,
Сьерра-Леоне, Южный Судан



Источник инфекции




**Грызуны, приматы,
больной человек**

Заражение происходит

- ✓ При контакте с дикими животными, разделке их туш, употреблении в пищу мяса и субпродуктов без термической обработки
- ✓ При контакте с содержимым кожных элементов больного и вещами, загрязненными вирусами
- ✓ При поцелуях и любых видах сексуальных контактов
- ✓ Воздушно-капельно при длительном близком контакте с больным, имеющим очаги поражения в горле или на слизистых полости рта
- ✓ От матери к плоду через плаценту, а также во время родов

Симптомы



Лихорадка



Головная боль



Боль в мышцах



**Увеличение
лимфатических узлов**

**Кожные
высыпания**



Меры профилактики

При посещении эндемичных стран:

- 1 Избегать контакта с дикими животными
- 2 Употреблять в пищу только термически обработанные продукты животного происхождения
- 3 Избегать тесных контактов с местным населением

По возвращении из эндемичных стран в случае появления недомогания обратиться к врачу и информировать его о факте пребывания на неблагополучной территории

При контакте с людьми, прибывшими из эндемичных стран и ощущающими недомогание, пользоваться маской и соблюдать требования к гигиене рук

