Желтая лихорадка

Острая вирусная инфекция, которая передается людям комарами

Эндемичные территории:
преимущественно страны Африки и Южной Америки

Источник инфекции

Больной человек и обезьяны

В отсутствие переносчиков больной человек не представляет опасности для окружающих

Механизм передачи

Трансмиссивный

Вирус передается при укусе комаров родов Aedes (в основном Ae. aegypti и Ae. albopictus) и Haemogogus

Инкубационный период

от 3 до 10 дней, в среднем — 5-6 дней

Симптомы:

Лихорадка до 40°С

Сильная головная боль

Тошнота и рвота

Боль в спине и ногах

Гиперемия лица и шеи

Желтушность кожи и склер

Геморрагическая сыпь

Кровотечения

Надежная защита от желтой лихорадки — вакцинация

Меры профилактики

Туристам, выезжающим в страны, эндемичные по желтой лихорадке, необходимо:

1. Не менее чем за 10 дней до въезда в эндемичную страну привиться от желтой лихорадки
2. Избегать укусов комаров
3. Носить закрытую одежду
4. Использовать репелленты
5. Использовать антимоскитные сетки для окон и дверей
6. Использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях