Меры профилактики при посещении эндемичных стран:

- Избегать контакта с дикими животными
- Употреблять в пищу только термически обработанные продукты животного происхождения
- Избегать тесных контактов с местным населением
- По возвращении из эндемичных стран в случае появления недомогания обратиться к врачу и информировать его о факте пребывания на неблагополучной территории
- При контакте с людьми, прибывшими из эндемичных стран и ощущающими недомогание, пользоваться маской и соблюдать требования к гигиене рук

Специфическая профилактика:

- По эпидемическим показаниям проводится вакцинация

Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте

ОСПА ОБЕЗЬЯН

Высококонтагиозное особо опасное вирусное заболевание

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОСПА ОБЕЗЬЯН

Высококонтагиозное особо опасное вирусное заболевание, передающееся человеку, распространенное в странах Центральной и Западной Африки

Эндемичные страны

Бенин, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Габон, Гана, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Республика Конго, Сьерра-Леоне, Южный Судан

Источник инфекции

Грызуны, приматы, больной человек

Больной человек становится заразным с момента появления симптомов заболевания и на протяжении всего течения болезни — до заживления всех очагов поражения и полного исчезновения корочек (до 3-х недель)

Инкубационный период
от 2 до 21 дня, в среднем 6–16 дней

Симптомы:

- ✓ **Лихорадка**
- ✓ **Головная боль**
- ✓ **Боль в мышцах**
- ✓ **Увеличение лимфатических узлов**
- ✓ **Кожные высыпания**

Высыпания возникают сначала на лице, а затем распространяются на другие части тела

В большинстве случаев оспа обезьян заканчивается самоизлечением и ее симптомы исчезают через 2–4 недели

⚠ **Тяжелое течение свойственно детям и пациентам с иммунодефицитом**

⚠

Группы высокого риска заражения:

- ✓ **Лица, посещающие эндемичные страны и не соблюдающие меры профилактики**
- ✓ **Медицинские работники**

Заболевание передается

При контакте с дикими животными, разделке их туш, употреблении в пищу мяса и субпродуктов без термической обработки

При контакте с содержимым кожных элементов больного и вещами, контаминированными вирусами

При поцелуях и любых видах сексуальных контактов

Воздушно-капельно при длительном близком контакте с больным, имеющим очаги поражения в горле или на слизистых полости рта

От матери к плоду через плаценту, а также во время родов