

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ (ШИГЕЛЛЕЗ)



Это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода *Shigella*, характеризующееся фекально-оральным механизмом передачи и поражением желудочно-кишечного тракта



Источник инфекции — больной человек или бактерионоситель

Пути передачи

- ✓ **Контактно-бытовой**
Через грязные руки и инфицированные предметы обихода
- ✓ **Водный**
Через инфицированную воду
- ✓ **Пищевой**
Через инфицированные продукты, чаще всего — молочные

Симптомы

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Головная боль и слабость
- ✓ Схваткообразные боли в животе
- ✓ Частый жидкий стул с примесью слизи и крови
- ✓ Тенезмы (ложные болезненные позывы к дефекации)



Меры профилактики на объектах, занимающихся транспортировкой, обработкой, приготовлением и реализацией пищевых продуктов:

- 1 Предварительный медицинский осмотр с лабораторным обследованием на возбудителей кишечных инфекций сотрудников перед поступлением на работу и периодические медицинские осмотры ежегодно
- 2 Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников, контактирующих с пищей, с соответствующей отметкой в медицинской книжке
- 3 Вакцинация сотрудников против дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям
- 4 Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в установленном порядке
- 5 Строгое выполнение на объекте санитарно-эпидемиологических требований
- 6 Немедленное отстранение от работы сотрудников с симптомами кишечной инфекции (боль в животе, тошнота, диарея, рвота) до получения отрицательных результатов лабораторных исследований

Противоэпидемические мероприятия в очаге бактериальной дизентерии:

- 1 **Изоляция больного**
заболевший должен быть отстранен от здоровых лиц
- 2 **Осмотр и обследование контактных**
для выявления и отстранения из коллектива бактерионосителей и лиц с симптомами инфекции
- 3 **Дезинфекция помещений**
влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств