

Ротавирусная инфекция

Острая вирусная инфекция, характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта с развитием ротавирусного гастроэнтерита



Источник инфекции — больной человек или бессимптомный вирусоноситель

Больной становится заразным за несколько дней до появления симптомов



Пути передачи



1 Контактно-бытовой
через загрязненные руки и предметы обихода



2 Водный
через загрязненную воду



3 Пищевой
через загрязненные продукты, чаще всего — молочные



Инкубационный период
от 14-16 часов до 7 дней,
в среднем 1-4 дня

Симптомы:



Повышение температуры тела



Диарея



Рвота



Обезвоживание



Катаральные явления



Действенная профилактика ротавирусной инфекции — активная вакцинация детей!

Неспецифическая профилактика:

- 1** Мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением и приемом пищи
- 2** Пить только кипяченую или бутилированную воду
- 3** Не использовать лед неизвестного происхождения для охлаждения напитков
- 4** Тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением
- 5** Купаться в предназначенных для этого водоемах, не допускать попадания воды в рот
- 6** В поездках уделять внимание безопасности воды и пищевых продуктов: избегать питания в подозрительных в эпидемиологическом отношении местах
- 7** В случае заболевания близких — изолировать больного, выделить ему индивидуальную посуду и белье, после контакта с больным тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком

