

МЕТАПНЕМОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ



Это острая респираторная вирусная инфекция, для которой характерны типичные симптомы: кашель, осиплость голоса, заложенность носа, насморк, одышка



Источник инфекции — больной человек



Пути передачи

- ✓ **Воздушно-капельный**
Вирус передается во время кашля, чихания, разговора
- ✓ **Контактно-бытовой**
Через грязные руки и предметы, загрязненные выделениями больного

Симптомы

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Осиплость голоса
- ✓ Заложенность носа
- ✓ Насморк
- ✓ Одышка



Меры профилактики:

- 1 Тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком после посещения общественных мест
- 2 Избегать прикосновений к лицу грязными руками
- 3 Не контактировать с людьми с признаками инфекционного заболевания
- 4 При сезонном подъеме уровня заболеваемости ОРВИ — использовать маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест
- 5 При уходе за больным соблюдать правила личной гигиены, надевать медицинскую маску, после контакта с больным тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком

Противоэпидемические мероприятия в очаге метапневмовирусной инфекции:

- Изоляция больного**
1 Заболевший должен быть отстранен от здоровых лиц до исчезновения клинических симптомов, но не менее чем на 7 календарных дней с момента появления симптомов
- Дезинфекция воздуха и помещений**
2 Частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств
- Осмотр контактных лиц**
3 Для выявления и своевременной изоляции больных или лиц с подозрением на заболевание острой респираторной вирусной инфекцией

Соблюдение этих мер предотвратит дальнейшее распространение инфекции и поможет сохранить здоровье