При присасывании клеща:

1. Как можно быстрее удалить клеща и обработать место укуса антисептиком
2. Поместить извлеченного клеща в емкость и доставить в лабораторию для исследования на наличие инфекций
3. При положительном результате обратиться в медицинскую организацию для получения рекомендаций
4. Если клеща не удалось сдать на анализ, наблюдать за самочувствием в течение 30 дней
5. В случае появления температуры, головной боли, эритемы в области присасывания клеща незамедлительно обратиться в медицинскую организацию



Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте

ИКСОДОВЫЙ КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ

Бактериальная инфекция, передающаяся человеку при присасывании клещей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ИКСОДОВЫЙ КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ

Это природно-очаговое заболевание, характеризующееся поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердца, имеющее склонность к затяжному хроническому течению

Возбудитель инфекции — бактерии рода *Borrelia*

Основной механизм передачи

Трансмиссивный

возбудитель передается при присасывании иксодовых клещей

Естественный резервуар возбудителя

Крупный рогатый скот, овцы, собаки, птицы, грызуны, олени

Зараженный человек не является источником возбудителя инфекции для других людей

Инкубационный период
от 2 до 30 дней, в среднем 10–14 дней

Места обитания клещей:

- Преимущественно хвойно-лиственные леса
- Парки и лесопарки
- Кладбища
- Дачные участки

Симптомы

- ✓ **Повышение температуры тела**
- ✓ **Слабость**
- ✓ **Головная боль**
- ✓ **Боль в мышцах и суставах**
- ✓ **Мигрирующая эритема**

При поздно начатой или неадекватной терапии заболевание приобретает хроническое течение с поражением суставов, кожи и нервной системы

При посещении мест обитания клещей, рекомендуется:

- Надеть однотонную светлую одежду и закрытую обувь, головной убор или капюшон
- Все элементы одежды (рукава, брюки и носки) должны плотно прилегать к телу и полностью его закрывать
- Брюки заправить в носки, верхнюю часть одежды заправить в брюки, волосы заправить под головной убор
- Использовать специальные аэрозольные средства против клещей в соответствии с инструкцией
- Ходить по тропам и избегать высокой травы и кустарников
- Не сидеть на траве, использовать брезент или туристический коврик
- Проводить само- и взаимоосмотры каждые 15–20 минут
- После возвращения домой снять одежду и полностью осмотреть тело, уделяя особое внимание пупку, паховым и подмышечным складкам, волосистой части головы и коже за ушами