

Пневмококковая инфекция


Группа инфекционных заболеваний, вызываемых *Streptococcus pneumoniae*, характеризующаяся многообразием клинических форм



Источник инфекции — больные любой формой инфекции, а также бактерионосители




Основной путь передачи



Воздушно-капельный передается при тесном общении, кашле, чихании, разговоре

Симптомы

Симптомы пневмококковой инфекции разнообразны и зависят от клинической формы болезни



Пневмония

лихорадка, озноб, слабость, обильное потоотделение, кашель, одышка, затрудненное дыхание, боль в груди



Менингит

лихорадка, резкая головная боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц, тошнота, рвота, спутанность сознания



Отит

высокая температура тела, стреляющая боль в ухе



Бактериемия

высокая температура тела, геморрагическая сыпь



Надежная защита от пневмококковой инфекции — вакцинация

Вакцинация детей:

- V1** в 2 месяца
- V2** в 4,5 месяца
- RV** в 15 месяцев

Вакцинация по эпидемическим показаниям показана:

- 1 детям в возрасте от 2 до 5 лет
- 2 лицам, подлежащим призыву на военную службу
- 3 лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких
- 4 лицам старше трудоспособного возраста, проживающим в организациях социального обслуживания

