

## Противоэпидемические мероприятия в очаге:



### Изоляция больного

Заболевший должен быть отстранен от здоровых лиц до исчезновения клинических симптомов, но не менее чем на 7 календарных дней с момента появления симптомов



### Дезинфекция воздуха и помещений

Частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств



### Осмотр контактных лиц

Для выявления и своевременной изоляции больных или лиц с подозрением на заболевание острой респираторной вирусной инфекцией



Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте



## МЕТАПНЕМОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Это типичная острая респираторная вирусная инфекция



Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека


# МЕТАПНЕМОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Это острая респираторная вирусная инфекция, для которой характерны типичные симптомы: кашель, осиплость голоса, заложенность носа, насморк, одышка



**Источник инфекции — больной человек**

## Пути передачи



### Воздушно-капельный

Вирус передается во время кашля, чихания, разговора



### Контактно-бытовой

Через грязные руки и предметы, загрязненные выделениями больного



### Инкубационный период

от 2 до 9 дней, чаще — 3–5 дней

## Симптомы:

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Осиплость голоса
- ✓ Заложенность носа
- ✓ Насморк
- ✓ Одышка



У взрослых исходно здоровых людей метапневмовирусная инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме



## К группе риска тяжелого течения метапневмовирусной инфекции относятся:

- дети младше 5 лет
- взрослые старше 65 лет
- лица с иммунодефицитом
- лица с хроническими заболеваниями



При тяжелом течении метапневмовирусной инфекции может потребоваться госпитализация и интенсивное лечение

## Меры профилактики:



Тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком после посещения общественных мест



Избегать прикосновений к лицу грязными руками



Не контактировать с людьми с признаками инфекционного заболевания



При сезонном подъеме уровня заболеваемости ОРВИ — использовать маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест



При уходе за больным соблюдать правила личной гигиены, надевать медицинскую маску, после контакта с больным тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком

