



Гемофильная инфекция типа b

острая инфекция с воздушно-капельным путем передачи, характеризующаяся преимущественным поражением респираторного тракта и оболочек мозга

Основной путь передачи




Воздушно-капельный передается во время кашля, чихания, разговора



Инкубационный период

от 2 до 4 дней



Источник инфекции — больные любой формой инфекции, а также здоровые носители




Симптомы:

симптомы гемофильной инфекции типа b разнообразны и зависят от клинической формы болезни




Менингит

лихорадка, головная боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц, тошнота, рвота, спутанность сознания



Пневмония

лихорадка, озноб, головная боль, слабость, обильное потоотделение, кашель, затрудненное дыхание, боль в груди



Сепсис

высокая температура тела, геморрагическая сыпь




Эпиглоттит

(воспаление надгортанника) озноб, лихорадка, слюноотечение, одышка, тахикардия, цианоз

При легком течении

ринит, боль в горле, конъюнктивит и др.



Надежная защита от гемофильной инфекции типа b — вакцинация

Вакцинация детей

Прививки детям проводят согласно национальному календарю профилактических прививок по схеме:

V1 в 3 месяца

V2 в 4,5 месяца

V3 в 6 месяцев

RV в 18 месяцев

