

Противоэпидемические мероприятия в очаге краснухи




Изоляция больного

Заболевший краснухой должен быть отстранен от здоровых лиц на срок не менее 7 календарных дней с момента появления сыпи



Дезинфекция воздуха и помещений

Частое проветривание и влажная уборка с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств




Наблюдение за контактными лицами

За непривитыми и не болевшими краснухой устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня

Надежная защита от краснухи — вакцинация



Ознакомьтесь с более подробной информацией у нас на сайте



КРАСНУХА


Острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи, сопровождающаяся появлением мелкой пятнисто-папулезной сыпи и увеличением лимфатических узлов



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ЧТО ТАКОЕ КРАСНУХА?

Острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи, сопровождающаяся появлением мелкой пятнисто-папулезной сыпи и увеличением лимфатических узлов



Источник инфекции
больной краснухой человек

Больной становится заразным
за 5 дней до появления сыпи

Пути передачи


- ✓ **Воздушно-капельный**
Вирус передается во время кашля, чихания, разговора
- ✓ **Трансплацентарный**
От матери к плоду



Инкубационный период
от 9 до 23 дней, в среднем — 21 день

Симптомы

- ✓ Повышение температуры тела
- ✓ Конъюнктивит
- ✓ Кашель и насморк
- ✓ Увеличение лимфатических узлов



Характерный симптом краснухи

Сыпь на разгибательных поверхностях рук и ног, вокруг суставов, на ягодицах и спине

Осложнения


- ✓ Ангина
- ✓ Пневмония
- ✓ Бронхит
- ✓ Менингит
- ✓ Энцефалит



Краснуха особенно опасна для беременных женщин в связи с высоким риском внутриутробного инфицирования плода, влекущего за собой множественные грубые пороки развития

Для синдрома врожденной краснухи характерна триада аномалий развития

- ✓ Катаракта
- ✓ Пороки сердца
- ✓ Глухота



Надежная защита от краснухи — вакцинация

Вакцинация проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н.

Детей прививают по схеме:
вакцинация — в 12 месяцев,
ревакцинация — в 6 лет.

Среди взрослых вакцинацию от краснухи проводят женщинам в возрасте до 25 лет,
не болевшим, не привитым,
привитым однократно и не имеющим сведений о прививке.

