

Лихорадка денге

острая вирусная инфекция, которая передается людям при укусе комаров



Эндемичные территории:

преимущественно страны Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна



Основной источник инфекции



Больной человек

В отсутствие переносчиков больной человек не представляет опасности для окружающих

Механизм передачи



Трансмиссивный

Вирус передается при укусе комаров вида *Aedes aegypti* и в меньшей степени — *Aedes albopictus*



Инкубационный период

от 3 до 15 дней,
в среднем — 5-7 дней

Симптомы:



Лихорадка до 40°C



Головная боль



Увеличение лимфатических узлов



Боль в мышцах и суставах



Тошнота и рвота



Боль в глазах



Обильная сыпь



Повторное заражение лихорадкой денге повышает риск развития тяжелой формы заболевания и летального исхода

Меры профилактики

Туристам, выезжающим в страны, эндемичные по лихорадке денге, рекомендуется:

- 1 Избегать укусов комаров
- 2 Носить закрытую одежду
- 3 Использовать репелленты
- 4 Использовать антимоскитные сетки для окон и дверей
- 5 Использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства, предназначенные для борьбы с комарами в помещениях

